

با اسمه تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
مرکز ملی پژوهش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان
معاونت دانش پژوهان جوان



باشگاه دانش پژوهان جوان

مبارزه‌ی علمی برای جوانان، زنده کردن روح جست و جو و کشف واقعیت‌هاست. «امام خمینی (ره)»

دفترچه‌ی سوالات مرحله‌ی اول

بیست و پنجمین دوره‌ی المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

صبح - ساعت: ۹:۰۰

کد دفترچه: ۱

| تعداد سوالات | مدت آزمون (دقیقه) |
|--------------|-------------------|
| ۴۰ | ۹۰ |

استفاده از ماشین حساب مجاز است.

توضیحات مهم

۱. کد برگه‌ی سوالات شما است. این کد را در محل مربوط روی پاسخ‌نامه علامت بزنید. در غیر این صورت پاسخ‌نامه‌ی شما تصحیح نخواهد شد.
۲. وقت کنید که برگه‌ی سوالات شما که در بالای هر یک از صفحه‌های این دفترچه نوشته شده است، با کد اصلی که در همین صفحه است یکی باشد.
۳. بلافاصله پس از آغاز آزمون تعداد سوالات داخل دفترچه و وجود همه‌ی برگه‌های دفترچه‌ی سوالات را بررسی نمایید. در صورت وجود هرگونه نقصی در دفترچه، در اسرع وقت مستنول جلسه را مطلع کنید.
۴. یک برگ پاسخ‌نامه در اختیار شما قرار گرفته که مشخصات شما بر روی آن نوشته شده است. در صورت نادرست بودن مشخصات برگ، در اسرع وقت مسؤول جلسه را مطلع کنید.
۵. همراه داشتن هرگونه کتاب، جزو و جدول تاویبی عناصر مجاز نمی‌باشد.
۶. همراه داشتن لوازم الکترونیکی نظیر تلفن همراه و لپ تاپ منوع است. همراه داشتن این قبیل وسایل حتی اگر از آن استفاده نکنید یا خاموش باشد، تقلب محسوب خواهد شد.
۷. آزمون مرحله‌ی دوم برای دانش‌آموزان سال اول دبیرستان صرف‌جنبه‌ی آزمایشی و آمادگی دارد و شرکت‌کنندگان در دوره‌ی تابستانی از بین دانش‌آموزان پایه‌ی دوم و سوم دبیرستان انتخاب می‌شوند.
۸. داوطلبانی می‌توانند دفترچه‌ی سوالات را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند، در غیر این صورت دفترچه باید همراه پاسخ نامه تحویل داده شود.

کلیه‌ی حقوق این سوالات برای باشگاه دانش پژوهان جوان محفوظ است

کد دفترچه سوالات : ۱

۱- کدام عبارت درست است؟

- (۱) اصل آفای (بناگذاری) ترتیب پرشدن اوریتالهای یک زیر لایه را بیان می کند.
- (۲) رادرفورد توانست تابش های حاصل از مواد پرتوزا را به کمک مدل انتی تامسون توجیه کند.
- (۳) m تعداد اوریتالها و جهت گیری آن ها را در فضا معین می کند.
- (۴) نخستین بار آنگریزم ، چهار خط طیف نشری اتم هیدروژن را یافت.

۲- به کدام ترکیب شیمیایی نمی توان هر دو اسم را نسبت داد؟


(۱) استانیک سولفات - قلع (IV) سولفات

(۲) CCl₄ : تراکلرومتان - کربن تراکلرید

(۳) Al₂O₃ : آلومینیم تری اکسید - آلومینیم (III) اکسید

(۴) N₂O₃ : دی نیتروژن تری اکسید - نیتروژن (III) اکسید


۳- در کدام گزینه ترتیب انرژی های تفکیک پیوند نادرست است؟




۲) نیتروژن - نیتروژن



۱) کربن - اکسیژن







۴) اکسیژن - اکسیژن






۳) هالوژن - هالوژن

۴- در کدام گزینه همه عناصر یکسان در هر گونه ، اعداد اکسایش یکسان دارند؟




۵- شکل هندسی کدام دو گونه یکسان است؟




۶- در کدام گزینه رابطه بین زوایای پیوند درست است؟

(۱) زاویه پیوند CCC در الماس $\hat{>} \text{ گرافیت} > \text{ پروپن}$

زاویه پیوند : $1 = 2 = 3$



(۲) زوایای پیوند در دی کلرومتان



کد دفترچه سوالات : ۱


۷- با توجه به تعداد الکترون های ظرفیت ، در چه تعداد از گونه های زیر ، X می تواند فلور باشد؟
 $N_2X^+(16e)$, $HXO_2(18e)$, $X_2O_3(28e)$, $NXN^{2-}(16e)$, $OXN(16e)$

۱ (۴) ۲ (۳) ۴ (۲) ۴ (۱)

۸- کدام مقایسه نادرست است؟

(۱) نقطه جوش : $PCl_3 > S_2Cl_2 > SiCl_4$:
 (۲) نقطه ذوب : $SiO_2 > Si > CO_2 >$ الماس
 (۳) انرژی شبکه بلور : $KF > NaCl > KBr > RbI$
 (۴) انرژی شبکه بلور : $AlF_3 > MgF_2 > NaF$

۹- برای چه تعداد از گونه های زیر می توان ساختاری با پیوند سه گانه رسم کرد؟



۱ (۴) ۲ (۳) ۴ (۲) ۳ (۱)

۱۰- اگر هیدروژن و اکسیژن هر کدام تنها دارای دو نوع ایزوتوپ باشد چند نوع مولکول آب اکسیژنه می تواند وجود داشته باشد؟

۱۲ (۴) ۹ (۳) ۱۰ (۲) ۸ (۱)

۱۱- کدامیک از جملات زیر نادرست است؟

- (۱) پدیده پرتوزایی با کاهش جرم ماده پرتوزا همراه است.
 (۲) پرتوهای کاتدی بر اثر برخورد با یک ماده فلوروسنت نورا بیانجاد می کنند.
 (۳) مواد دارای خاصیت فلورسانس نور با انرژی معینی را جذب و سپس نور با طول موج کوتاهتری را نشر می کنند.
 (۴) از اینکه در آزمایش ورقه طلای رادرفورد تنها تعداد بسیار اندکی از ذرات آلفا با زاویه بیش از ۹۰ درجه از مسیر اولیه منحرف شدنده می توان نتیجه گرفت که قطر هسته از قطر اتم بسیار کوچکتر است.

۱۲- اگر 5×10^{-5} مول از یک نمک متبلور حرارت داده شود، جرم آن $36/0$ گرم کاهش می یابد. تعداد مولهای آب تبلور موجود در یک مول این نمک کدام است؟ ($O=16, H=1$)


۴ (۴) ۶ (۳) ۵ (۲) ۱۰ (۱)

۱۳- انحلال پذیری یک نمک در دمای 20° درجه سانتی گراد برابر 100 گرم در 100 گرم آب و در دمای 80° درجه سانتی گراد برابر 250 گرم در 100 گرم آب است. اگر 14 گرم از محلول سیر شده این نمک از 80° درجه تا 20° درجه سرد شود چند گرم نمک رسوب خواهد کرد؟

۹ (۴) ۸ (۳) ۴ (۲) ۶ (۱)

کد دفترچه سوالات : ۱

۱۴- تعداد الکترون های ناپیوندی کدام گونه بیشتر است؟



۱۵- کدامیک از عبارت های زیر نادرست است؟

(۱) عامل اصلی ایجاد باران های اسیدی SO_2 می باشد.

(۲) دلیل توانایی حشرات در ایستاندن روی سطح آب، کم بودن کثش سطحی آب است.

(۳) در برخی کشورها، از روغن های گیاهی و حیوانی برای تولید سوخت استفاده می شود.

(۴) بیشتر حجم نفت تولیدی، به عنوان سوخت برای ایجاد گرمایش کار می رود.

۱۶- فرض کنید هوا دقیقاً شامل ۷۸ درصد مولی گاز N_2 ، ۲۱ درصد مولی گاز O_2 و ۱ درصد مولی گاز Ar است. اگر کل اکسیژن

موجود در هوا را خارج کنیم، جرم مولی متوسط هوای باقیمانده چند گرم بر مول می شود؟ ($Ar=40/0$ ، $O=16/0$ ، $N=14/0$)

۲۸/۱۵ (۴)

۲۸/۰۶ (۳)

۲۸/۸۴ (۲)

۳۰/۹۶ (۱)

۱۷- دمای انجماد کدام محلول از همه پایین تر است؟

(۱) محلول $0/010$ مولال $MgSO_4$ در آب

(۲) محلول $0/010$ مولال $NaCl$ در آب

(۳) محلول $0/015$ مولال شکر در آب

۱۸- اگر 750 میلی لیتر محلول $180 ppm$ از Ag^+ با 450 میلی لیتر محلول $45 ppm$ از Cl^- مخلوط شود، تقریباً چند میلی

گرم رسوب $AgCl$ تشکیل می شود؟ ($Ag=107/9$ ، $Cl=35/5$)

۱۷۹ (۴)

۱۳۰ (۳)

۱۰۵ (۲)

۸۲ (۱)

۱۹- مخلوطی از H_2S و CS_2 را در اکسیژن می سوزانیم تا CO_2 ، H_2O و SO_2 تولید شوند. جرم SO_2 حاصل، دقیقاً $3/85$ برابر

جرم CO_2 تشکیل شده است. درصد جرمی H_2S در مخلوط اولیه چقدر است؟ ($O=16$ ، $H=1$ ، $C=12$ ، $S=32$)

۳۹/۳ (۴)

۳۵/۱ (۳)

۲۲/۴ (۲)

۱۷/۶ (۱)

۲۰- در کدام گزینه همه نمک ها در آب محلول هستند؟

HgS ، PbS ، $AgNO_3$ ، $SrSO_4$ (۱)

$CaCl_2$ ، $NaBr$ ، $Pb(NO_3)_2$ ، $PbCl_2$ (۲)

K_2SO_4 ، Na_3PO_4 ، $CaCl_2$ ، $AgNO_3$ (۳)

$CaCl_2$ ، KNO_3 ، $NaCl$ ، $Ca_3(PO_4)_2$ (۴)

کد دفترچه سوالات : ۱

-۲۱- معادله خالت گاز کامل $PV=nRT$ است ، که در آن n تعداد مول گاز را نشان می دهد. با توجه به حجم مولی گازها در شرایط STP مقدار ثابت R بر حسب $\text{atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$ کدام است؟


۸/۳۱۴ (۴)

۰/۰۸۲۰۵ (۳)

۰/۰۸۳۱۴ (۲)

۸/۲۰۵ (۱)

-۲۲- هرگاه طی یک واکنش ، ۱ مول گاز از یک واکنش دهنده جامد یا مایع در دمای K و فشار ثابت ۱ اتمسفر تولید شود ، در نتیجه آن کاری برابر با J از سامانه واکنش روانه محیط اطراف می شود. با توجه به آن، ΔE واکنش انفجار نیتروگلیسیرین $C_3H_5(NO_3)_3(l)$ بر حسب کیلوژول بر مول در شرایط داده شده کدام است؟




-۲۲۵۵۵/۵ (۴)

-۲۳۱۴۵/۳ (۳)

-۲۳۳۳۸/۵ (۲)

-۲۳۲۴۳/۵ (۱)



+۵۰ (۴)

+۱۵۰ (۳)

+۱۰۰ (۲)

-۱۵۰ (۱)

-۲۴- واکنش $A-A(g) + B-B(g) \rightarrow 2A-B(g)$ با توجه به آنتالپی استاندارد پیوند های داده شده بر حسب کیلوژول کدام است؟

$$\Delta H_{A-A}^0 = -18 \text{ kJ} , \Delta H_{B-B}^0 = -18 \text{ kJ} , \Delta H_{A-B}^0 = 28 \text{ kJ mol}^{-1}$$

-۱۵۶/۸ (۴)

-۲۲۴ (۳)

-۱۹۶ (۲)

-۱۷۰ (۱)

-۲۵- هرگاه ۱۰۰ گرم آب با دمای 80°C به عنوان یک سیستم بسته تا دمای 30°C در فشار ثابت سرد شود ، کدام گزینه در مورد ΔH و ΔE آب در این فرایند درست است؟ حجم آب در جریان سرد شدن ثابت فرض می شود. گرمای ویژه آب برابر با $4/18 \text{ J g}^{-1} \text{ C}^{-1}$ می باشد.

$$\Delta E < \Delta H = -20/9 \text{ kJ} (۲)$$

$$\Delta E + \Delta H = -20/9 \text{ kJ} (۴)$$

$$\Delta E = \Delta H = -20/9 \text{ kJ} (۱)$$

$$\Delta E - \Delta H = +20/9 \text{ kJ} (۳)$$

-۲۶- آنتالپی استاندارد سوختن اتانول ، $(l) C_2H_5OH$ ، برابر با 1371 kJ mol^{-1} است. آنتالپی استاندارد تشکیل $CO_2(g)$ و $H_2O(l)$ در شرایط داده شده به ترتیب برابر با -294 و -286 - کیلوژول بر مول است. آنتالپی استاندارد تشکیل اتانول در این شرایط بر حسب کیلوژول بر مول کدام است؟

-۲۷۶ (۴)


+۶۹۱ (۳)

-۶۹۱ (۲)

-۶۸۰ (۱)

کد دفترچه سوالات : ۱

۲۷- مقایسه ΔH° دو واکنش زیر در دما و فشار یکسان کدام است؟



$$\Delta H_1^\circ < \Delta H_2^\circ \quad (۲)$$

$$\Delta H_1^\circ > \Delta H_2^\circ \quad (۱)$$

(۴) به معلومات بیشتر نیاز است.

$$\Delta H_1^\circ = \Delta H_2^\circ \quad (۳)$$

۲۸- کدام گزینه در مورد یون‌های داده شده درست است؟

A: یونی که وجود آن در آب باعث سختی موقت می‌شود.

B: یونی که زیاد بودن غلظت آن در آب باعث به وجود آمدن سختی دائم می‌شود.

C: یونی که برای جلوگیری از پوسیدگی دندان به آب آشامیدنی می‌افزاید.

D: یونی که برای لخته کردن ذره‌های کلوئیدی، در هنگام تصفیه به آب اضافه می‌کند.

E: یونی که برای جلوگیری از رشد جلبک‌ها، به منابع آب اضافه می‌شود.

| E | D | C | B | A | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| Fe^{3+} | Cu^{2+} | F^- | HCO_3^- | Na^+ | (۱) |
| Cu^{2+} | Fe^{3+} | F^- | Fe^{2+} | HCO_3^- | (۲) |
| Hg^{2+} | Fe^{3+} | F^- | Fe^{2+} | Na^+ | (۳) |
| Cu^{2+} | F^- | Fe^{2+} | Fe^{3+} | HCO_3^- | (۴) |

۲۹- یک نمونه دارای یک یا دو نوع کربنات از فلزات قلایی خاکی می‌باشد. از تجزیه حرارتی ۲/۸۸ گرم از این نمونه ۰/۴۴۸ لیتر

کربن دی‌اکسید در شرایط استاندارد آزاد می‌شود. اگر ۲ گرم از این نمونه را با ۲۰۰ میلی لیتر محلول ۱/۰ مولار HCl واکنش

دھیم حجم کربن دی‌اکسید آزاد شده در شرایط استاندارد بر حسب لیتر چقدر است؟ (Ba = ۱۳۷ ، Mg = ۲۴ ، Sr = ۸۷ ، O = ۱۶ ، C = ۱۲ ، Ca = ۴۰)

۴) اطلاعات کافی نیست ۰/۲۲۴ (۳) ۰/۱۰۰ (۲) ۰/۳۱۱ (۱)

۳۰- ۱/۴۱ گرم پرکلریک اسید متبلور خالص OxH_2O با ۲۰ mL $HClO_4$ محلول اضافی هیدروکسید باریم به غلظت ۱ M به طور
کامل واکنش می‌دهد و ۲ گرم باریم پرکلرات تشکیل می‌شود. برای خشی کردن ۲۰ mL محلول KOH به غلظت ۱M چند گرم
(Ba = ۱۳۷/۳ ، Cl = ۳۵/۵ ، O = ۱۶) مورد نیاز است؟

۲/۰۹ (۴) ۲/۳۷ (۳) ۲/۰۱ (۲) ۲/۷۳ (۱)

کد دفترچه سوالات : ۱

۳۱- می خواهیم میزان یون های سولفید و کلرید را در یک نمونه فاضلاب تعیین کنیم. برای این کار ابتدا 50 mL از نمونه فاضلاب را با مقدار اضافی محلول AgNO_3 محلو ط می کنیم. در نتیجه 400 mg AgCl و Ag_2S در ته ظرف تشکیل می شود. به 50 mL دیگر از این نمونه فاضلاب مقدار اضافی ZnSO_4 می افزاییم که در نتیجه آن 16 mg ZnS در نتیجه آن 50 mL غلظت یون Cl^- در فاضلاب تقریباً چند ppm است؟ ($\text{Ag} = 108$ ، $\text{Cl} = 35/5$ ، $\text{Zn} = 65$ ، $S = 32$)


۱۸۳۹ (۴)

۱۵۶۷ (۳)

۱۷۷۶ (۲)

۱۳۸۲ (۱)

۳۲- در یک ظرف درسته، مطابق شکل زیر، دو ظرف A و B به ترتیب محتوی محلول آبی NaCl و آب مقطّر قرار می دهیم. اگر به سیستم زمان کافی برای رسیدن به تعادل بدهیم، وضعیت نهایی سیستم چه خواهد بود؟



(۱) بخشی از محتویات ظرف A به ظرف B منتقل می شود.

(۲) محتویات ظرف A کاملاً تبخیر شده و مقداری از آن به ظرف B منتقل می شود.

(۳) بخشی از محتویات ظرف B به ظرف A منتقل می شود.

(۴) محتویات ظرف B کاملاً تبخیر شده و مقداری از آن به ظرف A منتقل می شود.

۳۳- چگالی محلو طی از کربن دی اکسید و اکسیژن در دما و فشار معین $1/35V$ برابر چگالی گاز نیتروژن در همان دما و فشار است. نسبت جرم اکسیژن به کربن دی اکسید در این محلو ط چقدر است؟ ($N = 14$ ، $O = 16$)

۴۴ به ۳۲ (۴)

۲۲ به ۳۲ (۳)

۳۲ به ۲۲ (۲)

۳۲ به ۴۴ (۱)

۳۴- درصد جرمی کدام عنصر در پوسته زمین بیشتر است؟

(۱) آهن

(۲) آلومینیم

(۳) سیلیسیم

(۴) کلسیم

۳۵- فراوانی کدام منبع آب موجود در کره زمین از همه کمتر است؟

(۱) رطوبت موجود در خاک

(۲) آب های زیرزمینی

(۳) رودخانه ها، دریاچه ها، آبگیرها

کد دفترچه سوالات : ۱

۳۶- نام ظرف آزمایشگاهی زیر کدام است؟



- (۱) بشر (۲) بالن حجمی (۳) استوانه مدرج (۴) اولن

۳۷- در ترکیبات CH_3I و CH_3F کدام یک به ترتیب بیشترین نقطه جوش و بیشترین انحلال پذیری در آب را دارد؟

- (۱) CH_3F و CH_3I (۲) CH_3I و CH_3F (۳) CH_3I و CH_3I (۴) CH_3F و CH_3F

۳۸- سیکلوهگزان در کدام یک از حلال های زیر کمترین انحلال پذیری را دارد؟

- (۱) پتانول (۲) دی اتیل اتر (۳) اتانول (۴) هگزان

۳۹- ابتدای نام ترکیبی با فرمول بسته $\text{C}_{11}\text{H}_{24}$ بر روی برچسب ظرف آن پاک شده است و فقط ".....-پروپیل هپتان" قابل تشخیص است. چند ساختار برای این ترکیب محتمل است؟

- ۱ (۴) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۱)

۴۰- محصول واکنش زیر کدام است؟

